



JETZT AKTUELL

Neue Mehltaurasse beim Spinat definiert

Bei der Internationalen Arbeitsgruppe für Peronospora in Spinat wurde basierend auf der aktuellen Datenlage eine neue Rasse definiert: Pe 20.



Vor allem im Sommer ist Falscher Mehltau (*Peronospora effusa*, Pe) beim Spinat ein grosses Thema. Deshalb empfehlen wir beim Anbau auf vollresistente Sorten gegen Falschen Mehltau zu setzen.

Sommersorten

Halb-Wirsing Typen	Resistenzen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Opal F1	Pe 1-20												
Kiowa F1	Pe 1-18, 20												
PV - 1569 F1	Pe 1-18, 20												
PV - 1901 F1	Pe 1-20												
Summerstone F1 (1800)	Pe 1-20												
Yakalo F1	Pe 1-3, 5-19												
Cugoe F1	Pe 1-6, 8, 9, 11-17, 19												
Pawnie F1	Pe 1-15, 17, 19, 20												
Jaspe F1	Pe 1-20												
Peridot F1	Pe 1-20												
Crater F1	Pe 1-20												

Glatte Typen	Resistenzen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Denton F1	Pe 1-18, 20												
Accordion F1 (1547)	Pe 1-15, 17, 19, 20												
Anatase F1	Pe 1-20												
Slate F1	Pe 1-20												
Kinkajou F1	Pe 1-9, 11-15, 17, 20												
Monterey F1	Pe 1-15, 17, 19, 20												

- Anbau empfohlen
- Anbau möglich
- vollresistent